

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar

rezolvare

1a) $f'(x) = 1 - e^{-x} > 0, \forall x > 0$.

b) Derivata este pozitivă pe $[0, \infty)$ și negativă pe $(-\infty, 0]$, deci avem doar punctul de extrem 0.

c) Din $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ și **b)** rezultă că, pentru orice m , ecuația are soluție unică.

2a) $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{t}{1+t^2} dt = \frac{1}{2} \ln(1+t^2) \Big|_1^{\sqrt{3}} = \frac{1}{2} \ln 2$.

b) Dacă F este o primitivă a funcției $t \rightarrow \frac{t}{1+t^2}$, atunci $f(x) = F(\operatorname{tg} x) - F(1)$, deci

$$f'(x) = (1 + \operatorname{tg}^2 x) F'(\operatorname{tg} x) = \operatorname{tg} x.$$

c) Raționând ca mai sus, $f'(x) + g'(x) = \operatorname{tg} x - \frac{1}{\operatorname{ctg} x} = 0$. Rezultă $f(x) + g(x) = \text{constant} = 0$.